

Causas del Picoteo y Canibalismo



El canibalismo es un problema prevalente en los pollos y aves de caza. Generalmente comienza con un simple picoteo entre las aves, pero la costumbre se va intensificando hasta que se encuentra fuera de control. Existen muchas condiciones que aumentan las posibilidades de que se convierta en un problema serio. El problema, con frecuencia, comienza con un inocente picoteo en el establecimiento del orden social o, en ciertos casos, arrancándose unas cuantas plumas. Algunos de los motivos que llevan al canibalismo son:

Sobrepoblación del galpón.

Corríjalo aumentando el espacio disponible para cada ave.

Suministre suficiente alimento y agua.

Todas las aves deben tener acceso, en cualquier momento, al agua y alimento.



Mantenga baja la intensidad de la luz.

La iluminación muy brillante mantiene la actividad y el canibalismo.

Mantenga comfortable la temperatura del galpón.

Si está demasiado caliente molesta a las aves y las hace más irritables.

Suministre los niveles dietéticos de los nutrientes recomendados.

Deficiencias en nutrientes como la metionina y la sal aumentarán el deseo de comer plumas y sangre.

Medique regularmente a las aves contra parásitos externos.

Los parásitos pueden estimular a las aves a picotearse y herirse la piel, lo que produce el frenesí del canibalismo

Elimine todas las aves enfermas, débiles, pequeñas, o de colores extraños.

Las aves atacarán y matarán a estos individuos por el instinto de conservación, lo que resulta en un canibalismo generalizado.

Claudio Fano